

Reservemiddelen	Beperkt voorschrijfbaar middelen
<ul style="list-style-type: none"> • Colistine • Daptomycine • Linezolid • Meropenem (en andere carbapenems) • Moxifloxacin • Rifampicine • Tigecycline (e.a. parenterale tetracyclines) • Vancomycine (e.a. glycopeptiden) • 5e generatie cefalosporinen (o.a. ceftaroline) • Amfotericine B • Caspofungine (e.a. echinocandinen) • Voriconazol • Ganciclovir 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceftazidime • Ceftriaxon • Ciprofloxacine • Gentamicine • Levofloxacine

Reserve en beperkt voorschrijfbaar antibiotica worden pas voorgeschreven wanneer de gebruikelijke middelen onvoldoende effectief zijn, of bij een specifieke indicatie. Reserve middelen worden restrictief voorgeschreven vanwege het risico op resistentieontwikkeling.

Monitoring op het voorschrijven van deze middelen, binnen Alrijne ziekenhuis, vindt frequent (dagelijks) plaats door het A-team. Bij advisering omtrent aanpassing gebruik of antibioticumswitch wordt het advies in HIX geplaatst, telefonisch contact opgenomen, of er volgt bedside consultatie.